

1. *Ampelis viridis*, d'Orb. et Lafresn., *Synops.*, p. 40 ; d'Orb., voy. Ois., pl. xxx, fig. 2. — Bolivie.

2. *Ampelis aureopectus*, Lafresn., Guér., *Mag. de zool.*, 1843, Ois., pl. 39. — *Ampelis elegans*, v. Tschudi, Wiegmann, *Arch.*, 1843, 1, p. 385. — Id., *Fauna Peruana*, Væg., p. 135. — Santa-Fé de Bogota et le Pérou.

3. *Ampelis Riefferii*, Boissonn., *Rev. zool.*, III, p. 3. — La Colombie.

4. *Ampelis arcuata*, Lafresn., *Rev. zool.*, 1843, p. 98. — Guér., *Mag. de zool.*, 1843, Ois., pl. 40. — La Colombie.

5. *Ampelis formosa*, Nob., Venezuela, *Rev. et Mag. de Zool.*, I, p. 275.

Capite superiore et laterali, mento gulaque circumscripte chalybaeo-nigris, corpore superiore reliquo cum alis et cauda lactissime psittacino-viridi, remigibus nigris, margine externo viridibus, interno versus basin pallide flavis, tertiariis tribus ultimis macula apicali subrotundata albida terminatis, pogonio externo viridibus, interno viridi-nigricantibus; alæ tectricibus internis flavis; corpore subtus ranunculaceo-flavo, pectore medio magis aurantiaco, qui color infra nigredinem gulæ in sanguineum transit; hypochondriis viridi variegatis, rostro miniato; pedibus pallide brunneis, unguibus ut videtur flavidis. — Long. tot. 6" 10''' ; al. 3" 1/2. — Mus. Brem. et Hamburg.

Toutes ces cinq espèces ont le bec d'un rouge plus ou moins orangé ; les pieds sont rouges chez les *Ampelis viridis*, *Riefferii* et *arcuatus*, tandis qu'ils sont d'un plombé brunâtre chez les *Ampelis aureopectus* et *formosus*.

---

DESCRIPTION de cinq nouvelles espèces d'Oiseaux de l'Afrique occidentale, par le Docteur G. HARTLAUB.

1. *Onychognathus*, Nob., n. gen.

Familia *Sturnidæ*, Subfam. — *Ptilonorhynchinæ*, Gray.

*Char. gen. rostrum* (pl. 14, f. 2). Capite longius, compres-

sum, grypanium, aduncum, culmine arcuato, basi applanato-rotundato; apice acuto elongato uncinato.

*Cauda* valde gradata, elongata; rectrices angustæ debiles, apice rotundatæ.

*Alæ* mediocres; remige prima spuria; tertia, quarta et quinta cæteris longioribus, æqualibus; remiges tertiariæ (pl. 14, f. 3) et tectrices alæ majores structuram exhibent valde extraordinariam; pogonium externum fascia longitudinali holosericea in duo quasi dimidia dispertitur, quorum unum superius (sæpe proximum) ordinarium, alterum inferius decompositum, laxum; quasi fimbriatum dependet.

*Pedes* robusti, breves, digito interno et externo æqualibus; unguibus mediocribus, validis.

*O. fulgidus*, Nob. Capite et collo æneo-virescentibus; pileo nitore nonnullo chalybeo; corpore ipso supra et infra nigro, nitore metallico violaceo resplendente; cauda nigra, supra æneo nitentē; alæ superficie externa (tectricibus majoribus et remigibus tertiariis tecta) æneo-virescente, tectricibus minoribus scapularibusque dorso concoloribus; remigibus primariis et secundariis atris, prima unicolore, reliquis dimidio majore basali laete rufis; subalaribus dorso concoloribus; pedibus nigris; rostro corneofusco, basin versus nigro; iride rubra. — Long. tot. 14" 2" (pied français) — Rostri a fr. 1" 5" 3/4. — Rostri a rictu 1" 7". — Alæ 5" 9". — Caudæ a basi 6" 8". — Tarsi 1" 2". — Digiti medii cum ungue 1" 2".

Habitat : île Saint-Thomé, golfe de Guinée. — Mus. Hamburg.

## 2. *Dicrurus modestus*, Nob.

*D. Niger*, nitore chalybeo, remigibus primariis et secundariis atris, subalaribus dorso concoloribus, subcaudalibus albedo variegatis; rostro et pedibus nigris; iride rubra; cauda furcata. — Long. tot. 10" 4". — Rostri a fr. 11". — Rostri a rictu 12" 1/2. — Caudæ 4" 5". — Alæ 5" 1".

Habitat : île des Princes, golfe de Guinée; Mapallon indigen, — Mus. Hamburg. (Ce n'est pas le *D. canipennis* de Swainson)

## 3. *Coturnix histrionica*, Nob.

*C.* Supra pallide fusco-cinerascens, irregulariter albedo et nigri-

cante transversim notata, plumis colli postici et lateralis, dorsi e interscapulii tectricibusque alæ macula longitudinali albida nigro marginata medio notatis; remigibus pallide fuscis, subtus cinereo-albicantibus, scapis extus fuscis, intus albis; pileo nucaque saturatius brunneis, subunicoloribus, fascia supraciliari stricta, valde elongata, alteraque pilei medii brevior ex flavicante albidis, vitta brevi inter nares et oculum aliaque longiore a rictu infra oculum excurrente fusco-nigricantibus, spatio intermedio albo; regione parotica rufo-brunnea; gula colloque antico albis; fascia lata nigraa mento per mediam gulam decurrens ibique maculam triangularem utrinque ad regionem paroticam usque adcurrentem formans ancoræ figuram in fundo albo gulæ exhibet, abdomine imo, crisso, subcaudalibus, hypochondriis pectoris lateribus tæniaque irregulari per colli latera decurrente late rufis, singulis plumis in colli et pectoris lateribus macula longitudinali albida nigro marginata — in hypochondriis et abdomine imo nata longitudinali nigra signatis; area magna nigra pectus et epigastrium medium occupat; rostro nigro, pedibus ut videtur flavidis; subalaribus albis; iride fusca. — Mâle. — Long. tot. 7 " 2". — Alæ 3 " 8". — Rostri a fr. 3". — Tarsi 12" 1/2.

Habitat : *île Saint-Thomé*, golfe de Guinée. — Mus. Hamburg.

Il se peut bien que cette charmante espèce de caille soit le même oiseau que le *Coturnix Delegorguei*, décrit page 615 du second volume de Delegorgue, *Voyage dans l'Afrique anstrale*; mais comme cette description est très-incomplète, nous prions le savant, dont les ouvrages sont encore inédits, de vouloir bien constater ou réfuter l'identité de ces deux oiseaux et de faire connaître son nom, s'il prétend qu'on respecte son autorité.

#### 4. *Athene leucopsis*, Nob.

♂ *A.* gula, supercilis latis plumisque faciei albis, his apicem versus nigris; corpore supra fulvescente-rufo, pilei plumis medio nigris, aliis albis nigro brunneoque notatis; colli latera, interscapulum et dorsum multas plumas simili modo pictas exhibent; tergo, uropygio, cauda remigibusque tertiariis obsolete rufis, gracilline et minus distincte nigro transversim notatis, harum nonnullis macula apicali alba nigro terminata ornatis; scapularibus obscure fuscis, ala spuria nigra, tectricibus majoribus apice albis, remigi-

bus primariis et secundariis pogonio interno nigris, externo rufo, nigro et albido variegatis; corpore subtus albido, pectore brunnescente, nigro irregulariter marmorato, abdomine pallide rufescente notato maculisque nonnullis longitudinalibus nigris ornato; tarsis rufis; rostro flavicante, apice corneo-carulescente; pedibus flavidis; iride flava. — Long. tot. 8" 2". — Alæ 5" 1/2. — Caudæ a basi 2" 8". — Tarsi 15".

Habitat : île *Saint-Thomé*, golfe de Guinée. — Mus. Hamburg.

5. *Turtur simplex*, Nob.

*T.* Gula alba, fronte et sincipite dilute canis; pileo, collo toto et interscapulio nitore columbino lilacino-purpurascence, sub certa luce smaragdino micantibus; corpore supra olivaceo-brunnescente, nitore metallico vix ullo; remigibus primariis (prima excepta) pagonio externo valde emarginatis; albo limbatis; subalaribus fuscis; pectore et hypochondriis ex flavescence brunneis versus abdomen mediam album magis isabellinis; subcaudalibus albis; rectricibus mediis dorso concoloribus, reliquis large cinereo terminatis; rostro nigro, pedibus rufescentibus. — Long. tot. 11" 7". — Alæ 5" 9". — Rostri a rictu 10". — Rostri a fr. 7". — Tarsi 10".

Habitat : île *Saint-Thomé*, golfe de Guinée. — Mus. Hamburg.

Le Musée de Hambourg a reçu par le même envoi quelques autres espèces d'oiseaux d'une grande rareté, entr'autres : *Muscipeta atrochalybea*, Thompson, de Saint-Thomé; le superbe et gigantesque *Ploceus grandis*, Gray, et le *Lamprotormis ignita*, Nordman, la plus magnifique espèce du genre, de l'île des Princes.

*P. S. M.* de Lafresnaye assure, à la page 240 de votre *Revue et Magasin*, etc., que le *Tanagra frugilegus* de Tschudi est identique avec la *T. Darwinii* de Bonaparte. C'est une erreur : le *Tanagra Darwinii* est bien certainement la femelle de *T. striata*, tandis que la *T. frugilegus* de Tschudi est une bonne espèce tout-à-fait différente; cette dernière a les parties inférieures du corps d'un orangé vif; ces mêmes parties sont *jaune de citron* chez la *T.*

*Darwini*, etc., etc. Le Musée de Brémén possède les deux espèces, dont la *T. frugilegus* provient des collections de M. Tschudi.

M. A. Salé nous envoie la note suivante de Santo-Domingo, en nous priant de la publier le plus tôt possible :

ORNISMIA *Catharinæ* Salé. — Longueur totale, 62 mill. ; — du pli de l'aile à son extrémité, 36 mill. ; — de la queue, 14 mill. ; — du bec, 11 mill.

*Mâle*. — Dessus du corps vert sombre plus noir vers la queue, plumes soyeuses et ressemblant à du poil, écailleuses et d'un plus beau vert sur la tête. Bec noir. La gorge garnie de plumes écailleuses verdâtres et entourées de gris. Le cou en dessous gris. Ailes noirâtres. Le dessous du corps et les flancs verts, la région anale blanche. Queue courte, noire, à pennes étroites et se rétrécissant à leur extrémité, couvertures inférieures vertes brillantes. Pattes noires.

*Femelles et jeunes*. — En dessus d'un vert plus clair et plus métallique s'étendant jusque sur la queue, qui est noire à l'extrémité ; les trois pennes extérieures sont blanches au bout. Dessous du corps gris.

Je dédie cette espèce à ma mère. On trouve ce petit oiseau dans les plaines ou sur la lisière des bois, à une demi-journée de marche de Santo-Domingo ; je l'ai trouvé aussi sur des montagnes non boisées. Il fait son nid à dix-huit pouces, deux pieds, et même trois de terre, sur des buissons épineux ou sur des feuilles de cactus, et toujours abrité par des branches ou des feuilles ; il est ordinairement tissé avec la soie du nid de certaines chenilles, et revêtu de lichen extérieurement ; la toile d'araignée entre aussi dans sa construction. Il pond deux œufs blancs assez gros par rapport à la taille de l'oiseau. Il niche à la fin de juillet et pendant le mois d'août. Les mâles, plus nombreux que les femelles, se font une guerre acharnée pour se disputer une fleur ou une femelle. Le chant est fort et per-